Algoritmo Basic Trauma Life Support (BTLS - Adulto) 1/2

Avvicinamento alla vittima

Dalla chiamata o dal quick look si capisce che la vittima presenta un trauma

Ricercare segni evidenti di pericoli, capire la dinamica grossolana, prepararsi a ciò che aspetta → Fare un "Quick Look"

Scena sicura? — No → Attendere VVF

Si ↓

Attendere VVF → **Garantire la sicurezza ambientale** → Accesso all'utente

Valutazione Primaria

Cosciente? — No → Senza muovere la vittima verificare presenza di respiro

Si ↓

A - Vie Aeree e protez. rachide → Valutare e **liberare Vie Aeree** ← Si — **Respira?**

No ↓

Senza muovere la vittima verificare presenza di respiro → **Respira?** — No → (Ev. Estricazione rapida) Posizionare supino ⚠

Somministrare **O2** alti flussi con reservoir

(Ev. Estricazione rapida) Posizionare supino → Iniziare manovre di **BLS(D)**

Posizionamento supino (Rimuovere il casco, pronosupinazione, ecc)

Prima del collare controllare eventuale turgore delle vene giugulari → Immobilizzazione manuale testa e posiz. **collare**

- Osservo
- PAlpo
- Conto
- Saturazione

L'espansione toracica e la simmetria;

Per sentire enfisema sottocute o volet costale;

La Frequenza Respiratoria;

Applicare SpO2

B - Respiro → Eseguire **OPACS**

C - Circolo e emorragie → Palpare il **polso carotideo** e contare la **frequenza cardiaca**

Se presente, PA Sistolica > 80mmHg → Palpare il **polso radiale**

Arrestare Emorragie evidenti

D - Disabilità neurologiche → Assegnare livello di coscienza con **AVPU**

- Alert
- Vocal
- Pain
- Unresponsive

E' sveglio

Risponde solo a stimoli verbali
Risponde solo a stimoli dolorosi

Incosciente

E - Esposizione e protez. termica → **Svestire** l'utente, controllare fratture, emorragie evidenti, ematomi, corpi estranei

Protezione termica

Lagemeldung e valutazione secondaria ← Si — **Persona Stabile?** — No → **Lagemeldung, Caricamento** rapido cucchiaio e Vacuum e **trasporto** (ospedale più vicino)

Instabilità: *FC* > 110/min o < 50/min; *FR* > 25/min o < 8/min; *SpO2* < 92% con O2; *Coscienza* < Alert; *Emorragia* incontrollabile; Polso radiale assente (*PA* < 80mmHg)

Tratto e modificato da linee guida IRC 2010